



## Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Biotehnički fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica

Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712

E-mail: [extension-pg@t-com.me](mailto:extension-pg@t-com.me)

### Suzbijanje voluharica u organskom voćnjaku

Štete u voćnjacima od strane glodara mogu biti veoma velike i to u godinama kada su klimatski uslovi povoljni za njihovo prenamnoženje. U voćnjacima su najopasnije voluharice koje su prisutne tokom cijele godine. U nedostatku hrane one uništavaju korijen mladih sadnica. Takođe mogu nanijeti značajne štete stablima guleći i jedući koru sa njih. Oštećena stabla su zakržljala u razvoju, osjetljivija su na niske temperature i mrazeve a često i potpuno propadaju.

Voluharice se od poljskih miševa razlikuju po spoljašnjem izledu. Kod voluharica su svi istureni dijelovi tijela (noge, rep, njuška, uši) kraći, a samo tijelo je valjkasto i vuče se po podlozi.



Kada je u pitanju organska poljoprivreda zaštita od ovih štetnika se svodi na preventivne mjere kao što su:

- košenje i iznošenje pokošene vegetacije u cilju održavanja prostorne barijere
- postavljanje žičane mreže u dnu ograde voćnjaka. Visina mreže je do 1m, čija je polovina ukopana a gornja ivica sa plastičnim ili metalnim pojasom širine 10cm
- postavljanje mreza oko svakog stabla





- omogućavanje prisustva predatora (mačka, pas, ptice - sova)

U borbi protiv voluharica a i drugih glodara mogu pomoći i dijelovi biljnih vrsta koji mirisom odbijaju glodare. Svježe orahovo ili zovino lišće, te jednogodišnje mladice zove postavljaju se direktno u otvore koje su glodari napravili. Repelentno dejstvo takođe ima i čorba koja se pravi od svježeg lišća i mladica zove.

- *2kg biljnih djelova potopi u 10l vode i ostaviti par dana (dok zapjeni). Čorbu procijediti i bez razređivanja zalivati aktivne rupe.*

Upotreba hemijskih sredstava rodenticida u organskoj proizvodnji nije dozvoljena. Naime rodenticidi se primenjuju na taj način što se stavljaju u aktivne rupe prilikom čega dolazi do kontaminacije zemljišta što nije dozvoljeno. Ipak, rodenticidi se mogu koristiti! KAKO?

Napravi se od plastičnih cijevi T-profil i postavi se pri stablo voćke. U dio koji naliže na zemlju stavi se zatrovani mamak (rodenticid). Na ovaj način izbjegnuta je kontakt preparata sa zemljom a suzbijanje voluharica će biti efikasnije.



Dipl.ing Mileva Marić  
Savjetodavna služba Herceg Novi